

お得意様 各位

〒151-0053

東京都渋谷区代々木 3-22-7

ゾエティス・ジャパン株式会社

ライブストックビジネス統括部

「ティーエスブイ 2」および「ティーエスブイ 3」 新しい投与方法のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧賜っております「ティーエスブイ 2」および「ティーエスブイ 3」につきまして、この度、使用上の注意の変更に伴いまして、連続投与器を用いた鼻腔内投与が可能となりましたのでご案内申し上げます。これにより、両製品の「10 頭分×1」剤型をこれまでよりも簡便に投与することができるようになりました。

なお、連続投与にあたりましては、(株)フロンティアインターナショナルが取り扱っております動物用医療機器「SIM-045: 2mL プレミアムフォーワードセレクトابل 5 基」(一般的名称: 連続注射器)と「SIM-046: イントラナサルノズル」をご利用願います。

引き続き、本製品をご愛顧頂きたく、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

謹白

記

製品名	剤型
ティーエスブイ 2	10 頭分×1
ティーエスブイ 3	10 頭分×1

添付文書の変更内容を別紙にてお知らせいたします。

最新の添付文書は次のホームページに掲載されておりますのでご確認ください。

(動物用医薬品検査所: <https://www.vm.nval.go.jp/>)

なお、現行の添付文書を封入した製品がしばらく流通することとなりますので、ご了承の程、お願ひ申し上げます。

本件に関するお問い合わせは、弊社営業担当までお願ひ致します。

以上

(別紙)

ティーエスブイ 2 添付文書の変更

(変更箇所:下線部)

変更前	変更後
<p>【使用上の注意】</p> <p>(牛に関する注意)</p> <p>・本剤の用法は鼻腔内投与に限定されていることから、投与部位を厳守し、吸気時に投与すること。</p> <p>・溶解したワクチンを投与する場合、滅菌済みの注射針付きディスポーザブル注射器を用い 2mL を吸引し、注射針を取り外した後、それぞれ左右の鼻腔内に 1mL ずつ投与すること。</p> <p>・投与器具は原則として 1 頭ごとに取り換えること。</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>(牛に関する注意)</p> <p>・本剤の用法は鼻腔内投与に限定されていることから、投与部位を厳守し、吸気時に投与すること。</p> <p>・溶解したワクチンを投与する場合、滅菌済みの注射針付きディスポーザブル注射器<u>あるいは鼻腔内投与が可能な連続注射器を用いること。</u>ディスポーザブル注射器を用いる場合は、2mL を吸引し、注射針を取り外した後、それぞれ左右の鼻腔内に 1mL ずつ投与すること。<u>鼻腔内投与が可能な連続注射器を用いる場合は、ワクチン液を鼻粘膜に直接投与すること。</u></p> <p>・投与器具は原則として 1 頭ごとに取り換えること。</p>

ティーエスブイ 3 添付文書の変更

(変更箇所:下線部)

変更前	変更後
<p>【使用上の注意】</p> <p>(牛に関する注意)</p> <p>・本剤の用法は鼻腔内投与に限定されていることから、投与部位を厳守し、吸気時に投与すること。</p> <p>・溶解したワクチンを投与する場合、滅菌済みの注射針付きディスポーザブル注射器を用い 2mL を吸引し、注射針を取り外した後、鼻腔内に投与すること。</p> <p>・投与器具は原則として 1 頭ごとに取り換えること。</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>(牛に関する注意)</p> <p>・本剤の用法は鼻腔内投与に限定されていることから、投与部位を厳守し、吸気時に投与すること。</p> <p>・溶解したワクチンを投与する場合、滅菌済みの注射針付きディスポーザブル注射器<u>あるいは鼻腔内投与が可能な連続注射器を用いること。</u>ディスポーザブル注射器を用いる場合は、2mL を吸引し、注射針を取り外した後、鼻腔内に投与すること。<u>鼻腔内投与が可能な連続注射器を用いる場合は、ワクチン液を鼻粘膜に直接投与すること。</u></p> <p>・投与器具は原則として 1 頭ごとに取り換えること。</p>