


製品名	エクセネル [®] 注	エクセネル [®] RTU EZ	エクセーデ [®] C	ドラクシン [®]
主剤	セフチオフル ナトリウム	セフチオフル 塩酸塩	セフチオフル	ツラスロマイシン
適応症 (牛)	<ul style="list-style-type: none"> ●肺炎 ●趾間フレグモーネ ●産褥熱 	<ul style="list-style-type: none"> ●細菌性肺炎 	<ul style="list-style-type: none"> ●細菌性肺炎 	<ul style="list-style-type: none"> ●細菌性肺炎
投与経路	筋肉注射	筋肉注射	耳根部皮下投与	皮下注射
投与量 (牛)	1~2mg (力価)	1mg (力価)	6.6mg (力価)	2.5mg (力価)
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●耐性化傾向のないセフチオフル ●3つの適応症 	<ul style="list-style-type: none"> ●溶解の手間の要らないセフチオフル製剤 ●これまでよりも注射がより容易に 	<ul style="list-style-type: none"> ●1回投与で少なくとも7日間持続 ●溶解の手間の要らないセフチオフル製剤 	<ul style="list-style-type: none"> ●1回投与で最適な作用持続時間 ●マイコプラズマへの有効性
使用禁止期間 (牛)	<ul style="list-style-type: none"> ●乳 24時間 ●肉 7日間 	<ul style="list-style-type: none"> ●乳 12時間 ●肉 12日間 	<ul style="list-style-type: none"> ●乳 設定なし ●肉 14日間 	<ul style="list-style-type: none"> ●乳 使用不可 ●肉 53日間
開封後の 保存期間	室温：12時間* 冷蔵：7日間	室温：42日間**	室温：12週間**	室温：28日間**
その他	注射部位の高い安全性	—	可食部位に影響なし	抗炎症効果***



☆ 第一次選択薬が無効である症例に限り使用すること