

フォステラ ゴールドは妊娠豚にも投与できるようになりました。

妊娠豚 でも 大丈夫。

豚サーコウイルス(2型)感染症用
不活化ワクチン



Fostera Gold

フォステラゴールド PCV
PCV²ワクチン



フォステラゴールド PCV MH
PCV²ワクチン + マイコプラズマ混合ワクチン

妊娠中の繁殖用雌豚への使用制限がなくなり、3週齢以上の健康な豚に投与が可能です。
※上記製品は要指示医薬品です。獣医師等の処方箋・指示により使用してください。

zoetis

フォステラ ゴールドは、 妊娠豚への安全性が確認されています。

試験：野外農場での安全性評価（申請資料）

■ 試験設定

群	被験薬	投与量	頭数	投与日 (妊娠期間)	観察終了
対照群	滅菌生理食塩水または滅菌水	2mL	20	25～35	分娩 1週間後
			20	65～75	
			20	85～95	
試験群	フォステラ ゴールドPCV MH	2mL	99	25～35	
			99	65～75	
			101	85～95	

*2か所の野外農場で実施。試験群の頭数はロット番号の異なる製品を投与した2群の合計。

■ 結果（試験群）

- ワクチン投与後の臨床所見（副反応）：異常なし
- 体温（直腸温）変化：発熱なし
- 注射部位の局所反応：なし
- 分娩（産子状態）：異常なし

また実験室下で妊娠豚（下記、試験対象豚）への試験を行ったところ、
ワクチンに起因する異常は母豚・子豚ともに認められませんでした。

● 試験対象豚

- 妊娠前半期（妊娠30～35日）
- 妊娠後半期（妊娠69～72日）

フォステラ ゴールドを妊娠豚に投与しても母豚に臨床的に
重大な異常は認められず、その子豚にも影響はなかったため、
妊娠豚への安全性が確認されています。